



Velphoro® (oxihidróxido sucroférico)
controla el fósforo con menos
comprimidos y más formas de tomarlo.

**Aligere un poco la carga del
tratamiento: ¡aquí se lo mostramos!**

Haga su día más ligero

A LA MANERA DE **VELPHORO**

 **VELPHORO®**
(sucroferric oxyhydroxide)
chewable tablets



Velphoro® (oxihidróxido sucroférico) ayuda a las personas con enfermedad renal crónica que reciben tratamiento con diálisis a controlar los niveles de fosfato en su sangre.



Consulte la Información importante de seguridad en la última página y la Información de prescripción completa adjunta.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS NECESITAN UN QUELANTE DE FOSFATO?

Muchos alimentos contienen fósforo. La diálisis filtra una parte, pero no todo, de modo que las personas que reciben tratamiento de diálisis pueden terminar teniendo demasiado. Si bien su cuerpo necesita fósforo para mantenerse saludable, el exceso puede afectar su salud general.



INGREDIENTES: PATATAS, ACEITE DE GIRASOL O ACEITE DE MAÍZ, SAL, DIACETATO DE SODIO, CULTIVOS DE QUESO, SAL, ENZIMAS, MANTECA, LECHE EN POLVO, AZÚCAR, ACEITE DE SOYA, SUERO, ÁCIDO CÍTRICO, FOSFATO DE DISODIO, ACEITE DE OLIVA.

Asegúrese de leer las etiquetas de los alimentos y busque el sufijo “fos”. Hay fósforo oculto en muchos alimentos.

La dieta y la diálisis son dos maneras de controlar los niveles de fósforo. Cuando la dieta y la diálisis no son suficientes, su médico puede recetarle un quelante de fósforo como Velphoro. Velphoro captura el fosfato en los alimentos que ha comido y ayuda a eliminarlo del cuerpo.



Velphoro se ha usado durante años con miles de personas que reciben tratamiento de diálisis diálisis como usted.

VELPHORO®
(sucroferric oxyhydroxide)
chewable tablets



Velphoro funciona como un imán que atrae los fosfatos de los alimentos que ingiere después de comerlos. Por eso Velphoro solo funciona si lo toma con la comida.



Consulte la Información importante de seguridad en la última página y la Información de prescripción completa que viene adjunta.

SIÉNTASE MÁS LIGERO CON VELPHORO

Su médico y el equipo de atención médica de diálisis han recomendado Velphoro para ayudarlo a controlar sus niveles de fosfato.

Velphoro es un quelante de fosfato más potente. Debido a que es más potente, puede tomar menos comprimidos. Un comprimido contiene más fósforo que otros quelantes.

Cuando las personas se cambiaron a Velphoro, el doble de ellas pudo controlar sus niveles de fosfato en comparación con el quelante de fosfato que tomaban antes. Solo con la mitad de la cantidad de comprimidos.



La mayoría de las personas toman solo **3 o 4 comprimidos de Velphoro por día en comparación con 9 a 12 comprimidos por día** de otros quelantes de fosfato.

 **VELPHORO**[®]
(sucroferic oxyhydroxide)
chewable tablets

TOME VELPHORO CUANDO COMA

Velphoro hace que la hora de la comida sea más sencilla, ya que puede tomarlo de diferentes maneras. Es fácil de romper, masticar o triturar, de modo que no es obvio para los demás que usted está tomando el medicamento.

Velphoro no está diseñado para ingerirlo entero. Simplemente “rómalo y tómelo”. Tómelo justo antes, durante o justo después de las comidas o los refrigerios.



ROMPA

o



MASTIQUE

o



TRITURE

¿Qué sucede si se olvida de tomarlo?

Si se olvida de tomar Velphoro, ingiera la dosis habitual con la siguiente comida. Recuerde: ¡solo funciona si lo toma con alimentos!

Consulte la Información importante de seguridad en la última página y la Información de prescripción completa que viene adjunta.



La dosis inicial también es ligera:
1 comprimido por comida.



El comprimido es de tamaño real.

Tome Velphoro según se lo recetó su médico:
Probablemente comenzará con 1 comprimido de Velphoro con cada comida.

Su dosis se puede ajustar después de un tiempo, según cómo se encuentren sus niveles de fosfato.

Después de un año o dos, la mayoría de las personas siguen tomando solo aproximadamente **4 comprimidos de Velphoro por día, y no por comida**, como con otros quelantes de fosfato.

 **VELPHORO**[®]
(sucroferriic oxyhydroxide)
chewable tablets

¿QUÉ PUEDO ESPERAR CUANDO TOME VELPHORO?

Hay ciertas cosas que debe saber cuando comienza a tomar Velphoro porque estar preparado no tiene reemplazo.

La mayoría de los efectos secundarios de Velphoro fueron leves.

Los más frecuentes fueron diarrea, que generalmente desapareció por sí sola. Asegúrese de informar a su equipo de atención médica si actualmente toma un laxante o ablandador de heces.

Velphoro está elaborado con hierro, que se une al fosfato y se elimina del cuerpo en las heces.

El resultado es menos fosfato en la sangre. Las heces de color negro son normales con Velphoro, ya que Velphoro contiene hierro.

En la práctica, algunos pacientes han presentado manchas en los dientes o erupciones en la piel mientras tomaban Velphoro.

Consulte la Información importante de seguridad en la última página y la Información de prescripción completa que viene adjunta.



Muy pocas personas dejaron de tomar Velphoro debido a los efectos secundarios. Sin embargo, asegúrese de informar a su equipo de atención médica si tiene alguna inquietud o pregunta mientras toma Velphoro.





Use el pastillero de Velphoro para que lleve siempre algunos comprimidos de Velphoro con usted. Guarde algunos comprimidos adicionales en la cartera, bolso o bolsillo del abrigo: donde piense que le pueda resultar práctico.* ¡Sea creativo!



*Mantenga el frasco o el pastillero de Velphoro bien cerrado.
Guarde a temperatura ambiente y por debajo de los 87 °F (30.5 °C).

Consulte la Información importante de seguridad en la última página y la Información de prescripción completa que viene adjunta.

CÓMO ACORDARSE DE TOMAR VELPHORO:

Tomar Velphoro con cada comida es la mejor manera de asegurarse de que funcione.

Las siguientes son algunas maneras de ayudarlo a recordar:



Coloque una nota adhesiva o **recordatorio en la puerta del refrigerador** para que Velphoro ocupe un lugar central en su cocina o pegue desde adentro una nota en la puerta principal para recordarle llevar su Velphoro con usted cuando salga



Conserve Velphoro en la mesa de la cocina o la encimera



Programe su teléfono con recordatorios 3 veces al día a la hora de la comida con un tono específico que solo indique: “¡Toma Velphoro!”



Hable con su equipo de atención médica. Puede sugerirle otras maneras de ayudarlo a tomar Velphoro e informarle qué esperar cuando lo toma.

CÓMO PAGAR VELPHORO:

La mayoría paga menos
de \$10 por receta de Velporo.



**Hable con su equipo de atención
médica sobre los programas que
pueden ayudarlo a ahorrar en sus
recetas mensuales de Velporo.**

**Consulte la Información importante de seguridad
en la última página y la Información de prescripción
completa que viene adjunta.**

INDICACIÓN

Velphoro® (oxihidróxido sucroférico) es un quelante de fosfato indicado para el control de los niveles de fósforo sérico en pacientes con enfermedad renal crónica que se realizan diálisis.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar con las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar. No los trague enteros. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos de venta con receta y medicamentos de venta libre, las vitaminas y otros suplementos. Velphoro puede interactuar con otros medicamentos.

Informe a su proveedor de atención médica si sufre de alguno de los siguientes: peritonitis (una infección) durante la diálisis peritoneal, trastornos hepáticos o gástricos significativos, cirugía gastrointestinal (GI) importante y reciente, antecedentes de hemocromatosis u otra enfermedad que tenga como resultado una acumulación de hierro en el cuerpo. Las personas con estas afecciones no fueron incluidas en los estudios clínicos con Velphoro y su proveedor de atención médica supervisará sus niveles de hierro mientras esté tomando Velphoro.

Velphoro puede ocasionar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son cambio de color de las heces, diarrea y náuseas. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparece. Para reportar efectos secundarios negativos asociados con la toma de Velphoro, comuníquese con Fresenius Medical Care North America (FMCNA) al 1-800-323-5188. Se le recomienda reportar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o visitar www.fda.gov/medwatch.

Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando.

Para obtener más información, vea la Información de prescripción completa adjunta en el bolsillo o visite www.velphoro.com.



Haga que su día sea más ligero con Velphoro (oxihidróxido sucroférico)



- Velphoro es un tipo diferente de quelante de fosfato. Es más potente, por lo que puede tomar menos comprimidos en cada comida.
- La mayoría de las personas toman 3 o 4 comprimidos de Velphoro al día, y no hasta 3 o 4 por comida, como otros quelantes de fosfato.
- Es fácil tomar Velphoro. Puede partirlo, masticarlo o triturarlo.
- Tómelo según lo recetado e incorpórelo a su plan de comidas diario.

Mi meta en cuanto al fósforo es la siguiente:

Hable con su equipo de atención médica para obtener más información sobre cómo Velphoro puede ayudarlo a controlar sus niveles de fósforo.

Para obtener más información, visite www.Velphoro.com.



Velphoro es una marca comercial registrada de Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd.

Distribuido por: Fresenius Medical Care North America Waltham, MA 02451
© 2018 Fresenius Medical Care, todos los derechos reservados.
PN 103654-01S Rev. A 12/2018

 **VELPHORO**[®]
(sucroferric oxyhydroxide)
chewable tablets